

NOUVEL ARRÊTÉ GUYANE : PRINCIPALES ESPÈCES

Après le texte et sa présentation, voici les principales espèces guyanaises concernant nos adhérents. Il s'agit pour l'essentiel de psittaciformes, mais également des columbiformes, mais surtout des passériformes...

Article 2

Famille et/ou ordre	Espèce
Psittacidés (Psittaciformes)	Ara macavouanne (<i>Orthopsittaca manilatus</i> / <i>Orthopsittaca manilata</i> / <i>Ara manilata</i>).
Psittacidés (Psittaciformes)	Ara bleu (<i>Ara ararauna</i>).
Psittacidés (Psittaciformes)	Ara noble (<i>Diopsittaca nobilis</i> / <i>Ara nobilis</i>).

Article 3

Famille / Ordre	Psittacidés (Psittaciformes)	Mitrospingidés (Passériformes)	Cardinalidés (Passériformes)	Thraupidés (Passériformes)
	Ara rouge (<i>Ara macao</i>).	Tangara noir et blanc (<i>Lamprospiza melanoleuca</i>).	Cardinal à poitrine rose (<i>Peuceiticus ludovicianus</i>).	Tangara cyanictère (<i>Cyanicterus cyanicterus</i>).
	Ara chloroptère (<i>Ara chloropterus</i>).		Granatelle de Pelzen/Paruline de Pelzelin (<i>Granatellus pelzelni</i>).	Tangara coiffe-noire (<i>Nemosia pileata</i>).
	Ara vert (<i>Ara severus</i>).		Piranga écarlate/Tangara écarlate (<i>Piranga olivacea</i>).	Tangara guira (<i>Hemithraupis guira</i>).
			Piranga vermillon/Tangara vermillon (<i>Piranga rubra</i>).	Tangara à dos jaune (<i>Hemithraupis flavicollis</i>).
			Cardinal érythromèle (<i>Caryothraustes erythromelas</i> /Periporphyrus erythromelas).	Conirostre cul-roux (<i>Conirostrum speciosum</i>).
				Conirostre bicolore (<i>Conirostrum bicolor</i>).
				Tangara à miroir blanc (<i>Conothraupis speculigera</i>).
				Tangara à épaulettes blanches (<i>Tachyphonus luctuosus</i>).
				Tangara à huppe ignée/Tangara à huppe rouge (<i>Tachyphonus cristatus</i>).
				Araguira gris (<i>Coryphospingus pileatus</i>).
				Dacnis à coiffe bleue (<i>Dacnis lineata</i>).
				Sporophile faux-bouvron (<i>Sporophila bouvronides</i>).
				Sporophile à ventre jaune (<i>Sporophila nigricollis</i>).
				Saltator gris (<i>Saltator coerulescens</i>).
				Grand Tardivole (<i>Emberizoides herbicola</i>).
				Paroaire rougecap (<i>Paroaria gularis</i>).
				Tangara à camail (<i>Schistochlamys melanopsis</i>).
				Calliste rouverdin (<i>Tangara gyrola</i>).
				Calliste tacheté (<i>Tangara varia</i>).
				Calliste syacou (<i>Tangara punctata</i>).
				Calliste tiqueté (<i>Tangara guttata</i>).
				Calliste passevert (<i>Tangara cayana</i>).

Famille / Ordre	Espèce				
	Columbidés (Columbiformes)	Psittacidés (Psittaciformes)	Cardinalidés (Passériformes)	Fringillidés (Passériformes)	Thraupidés (Passériformes)
	Pigeon ramiret (<i>Patagioenas speciosa/Columba speciosa</i>).	Toui à sept couleurs (<i>Touit batavicus</i>).	Evêque bleu-noir (<i>Cyanoloxia cyanoidea</i> / <i>Cyanocompsa cyanoidea</i>)	Organiste téité (<i>Euphonia violacea</i>).	Tangara émeraude/Guit-guit émeraude (<i>Chlorophanes spiza</i>).
	Pigeon rousset (<i>Patagioenas cayennensis/Columba cayennensis</i>).	Toui à queue pourprée (<i>Touit purpuratus</i>).	Cardinal flavert (<i>Caryothraustes canadensis</i>).	Organiste cul-blanc (<i>Euphonia minuta</i>).	Jacarini noir (<i>Volatinia jacarina</i>).
	Pigeon plombé (<i>Patagioenas plumbea/Columba plumbea</i>).	Toui à ailes variées (<i>Brotogeris versicolurus</i>).		Organiste nègre (<i>Euphonia cayennensis</i>).	Tangara à crête fauve (<i>Tachyphonus surinamus</i>).
	Pigeon vineux (<i>Patagioenas subvinacea/Columba subvinacea</i>).	Toui para (<i>Brotogeris chrysoptera</i>).			Tangara à galons blancs (<i>Tachyphonus rufus</i>).
	Colombe de Verreaux (<i>Leptotila verreauxi</i>).	Caique à tête noire (<i>Pyrilia caica</i> / <i>Pionopsitta caica</i>).			Tangara à bec d'argent (<i>Ramphocelus carbo</i>).
	Colombe à front gris (<i>Leptotila rufaxilla</i>).	Pione violette (<i>Pionus fuscus</i>).			Tangara mordoré (<i>Lanio fulvus</i>).
	Colombe rouviolette (<i>Geotrygon montana</i>).	Pione à tête bleue (<i>Pionus menstruus</i>).			Guit-guit céruléen (<i>Cyanerpes caeruleus</i>).
	Colombe à queue noire (<i>Columbina passerina</i>).	Caique à queue courte (<i>Graydidascalus brachyurus</i>).			Guit-guit saï (<i>Cyanerpes cyaneus</i>).
	Colombe rousse (<i>Columbina talpacoti</i>).	Amazone de Dufresne (<i>Amazona dufresniana</i>).			Tersine hirondelle (<i>Tersina viridis</i>).
		Amazone poudrée (<i>Amazona farinosa</i>).			Dacnis bleu (<i>Dacnis cayana</i>).
		Amazone aourou (<i>Amazona amazonica</i>).			Sporophile bouveron (<i>Sporophila lineola</i>).
		Toui de Sclater (<i>Forpus modestus</i> / <i>Forpus sclateri</i>).			Sporophile à ventre châtain (<i>Sporophila castaneiventris</i>).
		Toui été (<i>Forpus passerinus</i>).			Sporophile petit-louis (<i>Sporophila minuta</i>).
		Caique maïpouri (<i>Pionites melanocephalus</i>).			Sporophile curio (<i>Sporophila angolensis</i> / <i>Oryzoborus angolensis</i>).
		Papegeai maillé (<i>Derophtus accipitrinus</i>).			Sporophile crassirostre (<i>Sporophila crassirostris</i> / <i>Oryzoborus crassirostris</i>).
		Conure versicolore (<i>Pyrhura picta</i>).			Sporophile à ailes blanches (<i>Sporophila americana</i>).

Famille / Ordre	Espèce				
	Columbidés (Columbiformes)	Psittacidés (Psittaciformes)	Cardinalidés (Passériformes)	Fringillidés (Passériformes)	Thraupidés (Passériformes)
		Conure cuivrée (<i>Eupsittula pertinax</i> / <i>Aratinga pertinax</i>).			Saltator des grands-bois (<i>Saltator maximus</i>).
		Conure pavouane (<i>Psittacara leucophthalmus</i> / <i>Aratinga leucophthalma</i>).			Saltator ardoisé (<i>Saltator grossus</i> / <i>Pitylus grossus</i>).
					Sucrier à ventre jaune (<i>Coereba flaveola</i>).
					Calliste diable-enrhumé (<i>Tangara mexicana</i>).
					Calliste septicolore (<i>Tangara chilensis</i>).
					Calliste varié (<i>Tangara velia</i>).
					Tangara évêque (<i>Tangara episcopus</i> / <i>Thraupis episcopus</i>).
					Tangara des palmiers (<i>Tangara palmarum</i> / <i>Thraupis palmarum</i>).

Article 4